



ANTISTERIL

Accoppiamento e canto

Mating and singing

E' un'associazione di vitamine e minerali equilibrata da utilizzare per la preparazione nel periodo riproduttivo, per il canto, nei casi di disturbi della fertilità o nei casi di morte dell'embrione nell'uovo. Stimola e favorisce l'accoppiamento, esalta le funzioni riproduttive e la fecondità, facilita l'ovodeposizione, migliora la schiusa delle uova, riduce le anomalie di crescita e le mortalità pre- e neonatali. Contiene **Vitamina E**, ritenuta la vitamina della fertilità, indispensabile durante la preparazione alle cove per la sua azione antiossidante ed epitelio-protettrice. Contiene, inoltre, calcio assimilabile associato a vitamina D3: per questo migliora la formazione scheletrica embrionale e favorisce la giusta consistenza del guscio delle uova. Il suo utilizzo viene considerato nel quadro generale di trattamento Pre-Cove.

It is a balanced combination of vitamins and minerals developed for the preparation for the breeding season, singing, fertility disorders or in case of embryo death. It promotes and stimulates mating, enhances reproductive functions and fertility, helps egg-laying, promotes hatching, reduces growth disorders and pre- and neonatal death. It contains **Vitamin E**, known as the fertility vitamin, necessary during the preparation for brooding thanks to its anti-oxidant, epithelium-protective action. It also contains assimilable calcium combined with Vitamin D3, for this reason it enhances the embryo skeletal formation and contributes to the correct egg-shell consistency. Use it for a correct preparation of breeding season.

SI CONSIGLIA WE RECOMMEND

Per un fecondo accoppiamento e per una migliore vitalità dei nidiacei. **ANTISTERIL** si usa prima e dopo l'accoppiamento, durante l'ovodeposizione, nel periodo di cova e di allevamento dei nidiacei.

For a fertile mating and an improved vitality of nestlings. It is advised before and after mating, during egg-laying, incubation and rearing of nestlings.

INGREDIENTI INGREDIENTS

Minerali in soluzione acquosa.
Minerals in water solution.

ADDITIVI NUTRIZIONALI / kg NUTRITIONAL ADDITIVES


Vitamina A / Vitamin A	2.000.000	U.I.
Vitamina D3 / Vitamin D3	10.000	U.I.
Vitamina E / Vitamin E	6.000	mg

I valori riportati sono indicativi.
The values are indicative.

E' COMPATIBILE CON TUTTI GLI ALTRI ALIMENTI E/O ADDITIVI.
E' INDICATO PER TUTTI I TIPI DI UCCELLI DA GABBIA E VOLIERA.
COMPATIBLE WITH ALL OTHER FOOD AND/OR ADDITIVES.
FOR ALL CAGE AND AVIARY BIRDS.



ISTRUZIONI D'USO INSTRUCTIONS FOR USE



Uso: mescolare accuratamente al mangime o disciogliere nell'acqua di bevanda. **Dosi:** **Polvere:** 5-10 g per kg di mangime. **Liquido:** 5-10 ml (½-1 misurino) per litro di acqua di bevanda o kg di pastoncino. **Gocce:** 10-20 gocce (0,5-1 ml) per 100 ml di acqua di bevanda o 100 g di pastoncino. **Dose d'urto:** **Polvere:** 10-20 g per kg di mangime. **Liquido:** 10-20 ml (1-2 misurini) per litro di acqua di bevanda o kg di pastoncino. **Gocce:** 20-40 gocce (1-2 ml) per 100 ml di acqua di bevanda o 100 g di pastoncino. **Preparazione all'accoppiamento:** iniziare la somministrazione ai riproduttori circa 40 giorni prima dell' accoppiamento. **Accoppiamento:** proseguire la somministrazione quotidiana per 7/10 giorni. Ripetere il trattamento se necessario. **Canto:** si consiglia di iniziare l'uso un mese prima dell'inizio delle gare e durante l'intero periodo somministrare per tre volte a settimana.

Use: mix well with food or dissolve in drinking water. **Dose:** **Powder:** 5-10 g per kg of food. **Liquid:** 5-10 ml (½-1 dosing cap) per litre of drinking water or kg of food. **Drops:** 10-20 drop (0,5-1 ml) per 100 ml of drinking water or 100 g of food. **Loading dose:** **Powder:** 10-20 g per kg of food. **Liquid:** 10-20 ml (1-2 dosing cap) per litre of drinking water or kg of food. - **Drops:** 20-40 drops (1-2 ml) per 100 ml of drinking water or 100 g of food. **Preparation for breeding season:** start feeding to cock birds about 40 days before mating. **Mating:** during the breeding season continue feeding daily for 7/10 days. Repeat treatment if necessary. **Sing:** we recommend to start feeding **ANTISTERIL** one month prior to competitions and administer it three times a week during the complete period.

INFO:
info@pinetazootecnici.com - www.pinetazootecnici.com

